


EDIZIONE ITALIANA



PSITTACUS[®]



SPECIALISTI IN NUTRIZIONE DEGLI UCCELLI



L'obiettivo principale di Psittacus Catalonia, SL è quello di migliorare il benessere degli uccelli che alleviamo nelle nostre case e nei centri di riproduzione. Dalla nascita dell'azienda, nel 1998, ci siamo concentrati sullo sviluppo e sul miglioramento continuo della nostra gamma **PSITTACUS** di alimenti per pappagalli, in base all'esperienza dei nostri allevamenti e di altri centri che collaborano con noi.

I prodotti di questa gamma sono stati formulati per soddisfare perfettamente i requisiti nutritivi specifici degli uccelli psittacidi secondo la loro strategia di alimentazione, il loro stato fisiologico e la loro età. Questo ci ha portato a sviluppare alimenti e formule per l'alimentazione manuale di caratteristiche molto diverse che consentono la corretta alimentazione sia degli uccelli adulti (riproduttori e non) che dei pulli in fase di crescita.

Le caratteristiche innovative della gamma **PSITTACUS** hanno consentito un importantissimo miglioramento dei protocolli di riproduzione di molte specie, in particolare di quelli relativi all'allevamento manuale. Il miglioramento del benessere che ciò comporta ha un impatto positivo molto importante sia sui risultati riproduttivi che sul vigore e la vitalità del pullo.

La gamma **PSITTACUS** è il nostro principale contributo al miglioramento della psittacoltura e, con essa, alla propagazione delle popolazioni di specie in via di estinzione per le quali la riproduzione in cattività è fondamentale.



Xavier Viader · Teresa Masuet



Benvenuti a Psittacus Catalonia



CONTENUTI

GAMMA PRODOTTI	3
PERCHÉ UN MANGIME COMPLETO?	5
IL NOSTRO PELLET ESTRUSO	7
FORMULE DA IMBECCO	
Selettore delle formule da imbecco	9
Pappe da imbecco (Formula Hand Feeding)	11
Prima di selezionare una formula per l'alimentazione manuale	12
Come preparare la pappa da imbecco	13
Video-istruzioni	14
Psittacine Crop Milk	15
Frugivorous Psittacine Crop Milk	16
Pappa Neonatale	17
Pappa Neonatale Frugivori	18
Pappa ad Alta Energia	19
Pappa ad Alta Energia Plus	20
Pappa ad Alta Proteina	21
Pappa per Lory	22
Pappa per Pappagalli	23
Pappa Mini	24
Pappa per Cacatua	25
Pappa per Eclectus	26
General Recovery	27
Sonde Alimentari	28
FORMULE MANTENIMENTO	
Selettore delle formule di mantenimento	29
Raccomandazioni di somministrazione: Formule di mantenimento	31
Alta Energia	32
Alta Proteina	33
Mini	34
Minor	35
Micro	36
Omega	37
Raccomandazioni di somministrazione: Lory Gel, Lory Nectar, Lory Diet, Lory Pearls	38
Lory Gel	39
Lory Nectar	40
Lory Diet	41
Lory Pearls	42
MANGIME ESTRUSO MULTISPECIE	
Raccomandazioni di somministrazione	43
Parrot Maintenance	44
Parrot Breeder	45
FORMULE ALLEVAMENTO	
Raccomandazioni di somministrazione: Formule allevamento	46
Allevamento Alta Energia (High Energy Breeding)	47
Allevamento Alta Proteina (High Protein Breeding)	48
Raccomandazioni di somministrazione: Microspheres® 20/10	49
Come preparare Microspheres® 20/10	49
Microspheres® 20/10	50
Raccomandazioni di somministrazione: Eggfood	51
Eggfood	52
PRODOTTI COMPLEMENTARI	
Raccomandazioni per: Silex Grit	53
Raccomandazioni per: Calcium Grit	54
Raccomandazioni per: Vitamine e Minerali	54
Raccomandazioni per: Sprouting Helper	54
Silex Grit Fine/Silex Grit Grossa	55
Grit Calcico Fine/Grit Calcico Grossa	56
Vitamine e Minerali	57
Sprouting Helper	58
ANALISI	59



PAPPE DA IMBECCO



FORMULE DI MANTENIMENTO



MULTISPECIE

FORMULE DI ALLEVAMENTO

PRODOTTI COMPLEMENTARI

PERCHÉ UN MANGIME COMPLETO?

Semi o Pellet

Le miscele di semi sono state sempre il modo tradizionale di nutrire gli uccelli. È idea diffusa che siano un modo più naturale di nutrire gli uccelli in cattività. Tuttavia, i semi che troviamo sul mercato sono quelli coltivati e che hanno un interesse economico perché li usiamo per la produzione di olio, come base per la nostra alimentazione o per l'alimentazione di animali da allevamento. Tutti sono stati geneticamente modificati in secoli di coltivazione e selezione. Pertanto, non sono i semi che gli uccelli consumano nel loro habitat naturale. Inoltre, una miscela di semi ci permette di regolare solo alcuni macronutrienti come grassi o proteine, ma non quello degli acidi grassi o degli amminoacidi.

Ad esempio, il pappagallo cenerino africano richiede una dieta a base di noci di palma con un profilo di acidi grassi molto diverso rispetto ai semi di girasole.

Noci di palma



Semi di girasole



Quando si tratta di micronutrienti, vitamine, minerali e oligoelementi, le miscele di semi presentano molte carenze, ad esempio per quanto riguarda calcio, fosforo, sodio, manganese, zinco, ferro, selenio, iodio, vitamine A, D, K, B2, B5, B3, B12, colina.

Queste carenze costringono a completare la dieta con integratori costosi che raramente si adattano alle carenze specifiche di ogni particolare miscela.

Infine, va ricordato che tra il 30 % e il 60 % di una miscela di semi e noci sono gusci. Si genera quindi un grande volume di rifiuti, che insieme a quanto sopra accennato, le rende non convenienti.

Un pellet ci consente invece di concentrarci sui nutrienti e di adattarli alle esigenze specifiche di ciascuna specie o gruppo di specie con strategie di alimentazione simili e adatte al loro stato fisiologico.

Inoltre, ogni granulo di pellet è identico agli altri a livello nutrizionale, è equilibrato e viene consumato nella sua interezza (non ci sono sprechi). Pertanto, non consente la selezione da parte dei pappagalli. Per dare varietà alla dieta e stimolare i comportamenti alimentari, si consiglia di integrare con frutta e verdura, che ci permettono di apportare un arricchimento in quanto a consistenza, colore, sapore, pezzatura e livello di umidità.

Un pellet equilibrato e adeguato allo stato fisiologico ci consente di fornire i nutrienti necessari per il corretto sviluppo e il benessere dell'uccello. Di norma non sono necessari integratori aggiuntivi, anzi sono controindicati. Un pappagallo ben nutrito è in grado di difendersi da eventuali agenti patogeni e non necessita di trattamenti preventivi. Inoltre, un'alimentazione ottimale aumenta la longevità e la fertilità, consentendo una maggiore produzione e una maggiore sopravvivenza dei pulcini.



LA NOSTRA PROPOSTA



Esempio da una miscela di semi standard.



IL NOSTRO PELLET ESTRUSO

La maggior parte dei nostri prodotti sono estrusi. In poche parole, il processo di estrusione consiste nella cottura ad alta temperatura, umidità e pressione per un breve periodo di tempo. Al termine del processo, gli ingredienti misti vengono espulsi attraverso la matrice che dà forma al prodotto finale.

L'estrusione è ampiamente utilizzata nella produzione di alimenti per animali domestici come cani e gatti. Il suo utilizzo è molto esteso anche nell'industria alimentare umana, come nella produzione di cereali per la colazione, pasta, snack, pane tostato o biscotti ecc.

Il processo di estrusione inibisce la crescita di funghi e batteri e aumenta la durata di conservazione del prodotto. Questo processo è composto da due fasi:

Fase 1: Estrusione: La miscela di ingredienti passa attraverso diverse sezioni dell'estrusore:

Preparazione

Acqua e vapore vengono aggiunti alla miscela di ingredienti per aumentarne il contenuto di umidità e prepararla alla cottura. Durante questo processo inizia la gelatinizzazione dell'amido, che lo renderà più digeribile.

Estrusione

Utilizziamo un estrusore a doppia vite che permette una migliore impastatura e una cottura più uniforme. Inoltre, questo tipo di estrusore ci permette di ottenere una maggiore espansione, quindi il prodotto finito possiede una texture molto appetibile per i pappagalli. Durante il processo di estrusione, il cibo viene cotto a una temperatura compresa tra 120-140 °C.

Matrice

Il prodotto viene espulso attraverso la matrice per ottenere la forma desiderata.

Fase 2:

Asciugatura e cottura

Il mangime pellettato viene essiccato e raffreddato, raggiungendo una umidità massima del 7-8 %.

Rivestimento

Una volta che i granuli di pellet si sono raffreddati, applichiamo un rivestimento che contiene oli e vengono aggiunte vitamine. Questo processo garantisce che il prodotto finale mantenga la sua composizione nutrizionale ottimale e lo rende inoltre altamente appetibile.

QUALI SONO I PRINCIPALI VANTAGGI DELL'ESTRUSIONE?



- I nutrienti sono più digeribili.
- Alcuni nutrienti si conservano.
- I fattori antinutritivi vengono eliminati.
- Gli agenti patogeni come muffe e batteri vengono eliminati.
- Aumenta la stabilità e la sicurezza del prodotto, pertanto, il prodotto ha una durata di conservazione più lunga.
- Aumenta l'appetibilità del prodotto.

In evidenza



- PSITTACUS** non usa coloranti artificiali:
- Sono vietati dalle normative UE. Non apportano alcun vantaggio al prodotto.
- La maggior parte dei pappagalli seleziona regolarmente alcuni colori rispetto ad altri, generando perdite inutili.
- Utilizza solo ingredienti no-OGM.
- Utilizza solo antiossidanti naturali.

- Il nostro imballaggio consiste principalmente in sacchetti di plastica a tre strati che garantiscono la protezione degli alimenti da luce, umidità, odori e condizioni esterne, aumentandone così il periodo di scadenza e garantendo che raggiungano il consumatore finale con la massima garanzia.



Pappe Neonatali (allevamento a mano)

1ª fase

2ª fase

Pappe di
continuazione

Pappe Neonatali (allevamento a mano)

1ª fase

2ª fase

Pappe di
continuazione



Pappagallo cenerino
Ara
Pappagallo del Capo
Caicco Testanera



Psittacine Crop Milk



Neonatal
Hand Feeding



High Energy
Hand Feeding



Ara Gaicino
Cacatua delle Palme
Parrocchetto Dorato
Ara dalle ali verdi
Ara Verde



Psittacine Crop Milk



Neonatal
Hand Feeding



High Energy Plus
Hand Feeding



Amazona
Pappagallo Testablu
Parrocchetto dal collare



Psittacine Crop Milk



Neonatal
Hand Feeding



High Protein
Hand Feeding



Cacatua Rosa
Cacatua Crestagliata



Psittacine Crop Milk



Neonatal
Hand Feeding



Cockatoo Special
Hand Feeding



Cornuto Capoaazzurro
Cacatua Rosa
Inseparabile di Fisher
Rosella Cremisi
Pappagallo Turchese
Calopsitta
Parrocchetto Ondulato



Psittacine Crop Milk



Mini
Hand Feeding



Psittacula
Aratinga (Conuro di Cuba)
Parrocchetto monaco



Psittacine Crop Milk



Neonatal
Hand Feeding



Parrot Hand Feeding



Psittacine Crop Milk



Parrot Hand Feeding



Caicco Ventrebianco
Parrocchetto Guanceverdi



Frugivorous Psittacine
Crop Milk



Frugivorous
Neonatal Hand Feeding



High Protein
Hand Feeding



Parrot
Hand Feeding



Pappagallo Ecletto



Frugivorous Psittacine
Crop Milk



Frugivorous
Neonatal Hand Feeding



Ecletus
Hand Feeding



Trichoglossus Stephens
Parrocchetto ondulato



Frugivorous Psittacine
Crop Milk



Frugivorous
Neonatal Hand Feeding



Lory Special
Hand Feeding

PAPPE DA IMBECCO (FORMULA HAND FEEDING)

Indicate per l'alimentazione dei pulli

La pappe de imbecco sono indicate per allevare a mano i piccoli pappagalli.

Questi prodotti per l'alimentazione manuale sono stati formulati per costituire il 100 % della dieta di un pulcino di pappagallo durante l'intero periodo di crescita: dalla nascita all'involo.

Per la maggior parte delle specie il processo di allevamento manuale richiede l'uso di 3 diverse formule di alimentazione manuale. La composizione di ogni formula viene adattata per soddisfare il fabbisogno nutritivo specifico del pullo e secondo le sue capacità digestive rispetto a una determinata età.

In fase di svezzamento la formula per l'alimentazione manuale dovrebbe essere progressivamente sostituita dalla formula per età giovanile o adulta più adatta alla specie.

Sebbene la refrigerazione delle formule per l'alimentazione manuale non sia consigliata, è possibile congelarle se conservate in contenitori chiusi ermeticamente.

PSITTACUS offre anche la formula di alimentazione manuale ricostituente per uccelli adulti.

PSITTACINE CROP MILK	FRUGIVOROUS PSITTACINE CROP MILK
NEONATAL	FRUGIVOROUS NEONATAL
HIGH ENERGY	HIGH ENERGY PLUS
HIGH PROTEIN	LORY SPECIAL
PARROT HAND FEEDING	MINI
COCKATOO SPECIAL	ECLECTUS SPECIAL
GENERAL RECOVERY	

Dimensioni reali


PRIMA DI SELEZIONARE UNA FORMULA PER L'ALIMENTAZIONE MANUALE

È importante selezionare correttamente la formula di alimentazione manuale in base alla specie. Il selettore della formula di alimentazione manuale permette di identificare graficamente la specie da allevare (vedi pagine 9 e 10).

È inoltre importante selezionare la formula per l'alimentazione manuale in base all'età dell'uccello. Esistono due gruppi di formule per l'alimentazione manuale: quelle indicate per le fasi neonatali e quelle indicate per la fase di continuazione. Il cambiamento avviene nel momento in cui iniziano a spuntare le piume. Questo è il momento in cui le formule di alimentazione manuale neonatale dovrebbero essere sostituite da formule di alimentazione manuale di continuazione.

Se il pullo non ha ancora le piume, bisogna selezionare una formula per l'alimentazione manuale dal gruppo delle formule neonatali. Come indicato nel grafico, se si tratta di un pullo di uovo appena schiuso deve essere selezionata una formula per l'allevamento manuale neonatale della 1ª fase (un latte di gozzo). Si tratta di formule per l'alimentazione manuale altamente concentrate che possono essere somministrate solo per un periodo di tempo molto limitato, fino a 5-9 giorni di vita (a seconda della specie). Da quel momento in poi, il latte di gozzo dovrebbe essere progressivamente sostituito da una formula per l'alimentazione manuale neonatale della 2ª fase. Per alcune specie è possibile passare dal latte di gozzo direttamente alla formula di continuazione manuale, allungando il periodo di transizione tra le due. La formula di alimentazione manuale di continuazione dovrebbe essere utilizzata fino a quando iniziano a spuntare le prime piume, a quel punto è necessario passare alla formula di alimentazione manuale di continuazione pertinente.

Un corretto utilizzo delle formule di alimentazione manuale neonatale della 1ª fase permette all'uccello di raddoppiare il peso della schiusa già al terzo giorno, e di triplicarlo al sesto giorno proprio come accade in natura. È importante ricordare che un uccello che cresce vigorosamente, genera calore e **non richiede temperature elevate. Pertanto dovremmo ridurre rapidamente la temperatura dell'incubatrice. Raccomandiamo inoltre che gli uccelli siano tenuti in nidiate a temperatura non omogenea, con una fonte di calore laterale, dando all'uccello la possibilità di avvicinarsi o allontanarsi da tale fonte.**




PAPPE DA IMBECCO (HAND FEEDING FORMULAS)

Indicate per l'alimentazione dei pappagalli

COME PREPARARE LA PAPPA DA IMBECCO

Concentrazione del 25 % (25 % formula in polvere + 75 % d'acqua)



- 1 Aggiungere **1 parte** (25 %) di formule in polvere in un contenitore.
- 2 Aggiungere **3 parti** (75 %) di acqua calda (36-39 °C).
Evitare l'uso del microonde.
- 3 Mescolare accuratamente con una frusta in acciaio inox.
- 4 La formula è pronta quando si raggiunge la consistenza dello yogurt naturale.

La proporzione in volume non è esatta, è una semplificazione. Le prime volte che la formula viene preparata è consigliabile **utilizzare le proporzioni in peso**: 25 % di formula in polvere in peso e 75 % di acqua in peso.

RACCOMANDAZIONI PER FORMULE DI ALIMENTAZIONE MANUALE

- Scegliere la formula per alimentazione manuale in base all'età e alla specie del pullo da allevare.
- L'assunzione per pappagalli medi e grandi varia da 7 a 10 ml di formula ricostituita per ogni 100 g di peso corporeo ad ogni sessione di alimentazione. Per i pappagalli più piccoli, l'assunzione è maggiore, fino a 16 ml per ogni 100 g di peso corporeo. Il gozzo dell'uccello dovrebbe essere pieno, ma non troppo.
- Al mattino, verificare che il gozzo sia vuoto.
- Le transizioni da una formula all'altra dovrebbero essere fatte progressivamente.
- Si consiglia di somministrare la formula utilizzando un tubo morbido.
- L'avanzo deve essere eliminato dopo ogni sessione di alimentazione.
- Dopo l'apertura, conservare in un contenitore ermetico in un luogo fresco e asciutto.



Come preparare la
pappa da imbecco
(1ª fase)



Come preparare la
pappa da imbecco
(2ª fase)



Come preparare la
pappa da imbecco
di continuazione

PAPPE DA IMBECCO (HAND FEEDING FORMULAS)

Indicate per l'allevamento a mano di pappagalli



Psittacine Crop Milk

Questa pappa della prima età è ideale per l'allevamento di pulli di pappagalli granivori durante la 1ª fase neonatale. Deve essere somministrata dalla schiusa fino a 5-9 giorni di vita, a seconda della specie.

Questo prodotto è una formula per l'alimentazione manuale esclusiva, altamente concentrata e digeribile. Contiene papaia, che favorisce il transito digestivo. È particolarmente consigliato per gli allevatori che incubano le uova artificialmente. Favorisce una crescita vigorosa simile a quella ottenuta dalle migliori coppie riproduttive. Tale vigore favorisce la salute e riduce al minimo il rischio di contrarre malattie.

Raccomandiamo di somministrare la quantità appropriata in più sessioni di alimentazione al giorno, di solito 7-8 sessioni nei primi giorni di vita. Deve essere somministrato a una concentrazione del 25 % dal terzo giorno di vita. Il primo giorno, la concentrazione dovrebbe essere aumentata da circa l'1 % per la prima sessione al 20 % nell'ultima.

Componenti analitici: Proteina grezza 44,0 %, Grassi grezzi 40,0 %.

Confezioni: sacchetto da 500 g.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 9-14 e 59-60.



PAPPE DA IMBECCO (HAND FEEDING FORMULAS)

Indicate per l'allevamento a mano di pappagalli



Frugivorous Psittacine Crop Milk

Questa pappa della prima età è ideale per l'allevamento di pulli di pappagalli frugivori durante la 1ª fase neonatale. Deve essere somministrata dalla schiusa fino ai 7-8 giorni di vita, a seconda della specie.

Questo prodotto è una formula per l'alimentazione manuale esclusiva, altamente concentrata e digeribile. Contiene papaia, che favorisce il transito digestivo. È particolarmente consigliato per gli allevatori che incubano le uova artificialmente. Favorisce una crescita vigorosa simile a quella ottenuta dalle migliori coppie riproduttive. Tale vigore favorisce la salute e riduce al minimo il rischio di contrarre malattie.

Raccomandiamo di somministrare la quantità appropriata in più sessioni di alimentazione al giorno, di solito 7-8 sessioni nei primi giorni di vita. Deve essere somministrato a una concentrazione del 25 % dal terzo giorno di vita. Il primo giorno, la concentrazione dovrebbe essere aumentata da circa l'1 % per la prima sessione al 20 % nell'ultima.

Componenti analitici: Proteina grezza 39,0 %, Grassi grezzi 29,5 %.

Confezioni: sacchetto da 500 g.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 9-14 e 59-60.



PAPPE DA IMBECCO (HAND FEEDING FORMULAS)

Indicate per l'allevamento a mano di pappagalli



Pappa Neonatale (Neonatal Hand Feeding)

Questa pappa della prima età è ideale per l'allevamento di pulli di pappagalli granivori durante la 2ª fase neonatale. Dovrebbe essere somministrata dai 5 ai 9 giorni di vita fino al momento in cui iniziano a spuntare le piume. È ideale per un'ampia varietà di specie come *Psittacus*, *Ara*, *Amazona*, *Cacatua*, *Poicephalus*, *Psittacula*, *Aratinga* e *Platyserco*.

Contiene un'elevata percentuale di uovo intero disidratato e papaia che favoriscono il transito digestivo.

Dalla prima settimana di vita in poi, i pulcini dovrebbero mangiare fino a sei volte al giorno, anche se ciò può variare a seconda della specie. La capacità del gozzo indicherà la quantità da somministrare ad ogni sessione di alimentazione, di solito tra 7-10 ml di formula per ogni 100 g di peso corporeo. Il numero di sessioni di alimentazione dovrebbe diminuire con l'età.

Componenti analitici: Proteina grezza 24,0 %, Grassi grezzi 20,0 %

Confezioni: sacchetto da 1 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 9-14 e 59-60.



PAPPE DA IMBECCO (HAND FEEDING FORMULAS)

Indicate per l'allevamento a mano di pappagalli



Pappa Neonatale Frugivori (Frugivorous Neonatal Hand Feeding)

Questa pappa della prima età è ideale per l'allevamento di pulli di pappagalli frugivori durante la 2ª fase neonatale. Dovrebbe essere somministrata dai 7 agli 8 giorni di vita fino al momento in cui iniziano a spuntare le piume. È ideale per una varietà di specie di pappagalli come quelli della tribù dei Loriini e quelli dei generi *Eclectus*, *Pyrrhura* e *Pionites leucogaster*.

Contiene un'elevata percentuale di uovo intero disidratato e papaia che favoriscono il transito digestivo. Può essere somministrata anche come integratore proteico per coppie riproduttive di specie di loriini e lorichetti con pulcini.

A partire dalla prima settimana di vita, i pulcini dovrebbero mangiare fino a sei volte al giorno, anche se ciò può variare a seconda della specie. La capacità del gozzo indicherà la quantità da somministrare ad ogni sessione di alimentazione, di solito tra 7-10 ml di formula per ogni 100 g di peso corporeo. Il numero di sessioni di alimentazione dovrebbe diminuire con l'età.

Componenti analitici: Proteina grezza 29,0 %, Grassi grezzi 19,0 %

Confezioni: sacchetto da 1 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 9-14 e 59-60.



PAPPE DA IMBECCO (HAND FEEDING FORMULAS))

Indicate per l'allevamento a mano di pappagalli



Pappa ad Alta Energia (High Energy Hand Feeding)

Questa pappa di continuazione è ideale per l'allevamento manuale di specie di pappagalli che hanno bisogno di diete ricche di grassi come *Psittacus*, *Poicephalus*, la maggior parte di *Ara* species, *Pionites melanocephalus* e *Cacatua moluccensis*. Dovrebbe essere somministrata dal momento in cui iniziano a spuntare le piume fino allo svezzamento.

Contiene olio di palma grezzo, il grasso vegetale più adatto a queste specie e papaia, che favorisce il transito digestivo.

L'assunzione giornaliera varia tra 7-10 ml di formula per ogni 100 g di peso corporeo per sessione di alimentazione. Il numero di sessioni di alimentazione al giorno dipenderà dall'età e dalla specie del pappagallo. Nel caso del pappagallo cenerino africano, ad esempio, questo prodotto dovrebbe essere introdotto progressivamente a partire dalle 3 settimane di vita.


Componenti analitici: Proteina grezza 18,0 %, Grassi grezzi 20,0 %.

Confezioni: sacchi da 1 kg e 5 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 9-14 e 59-60.

PAPPE DA IMBECCO (HAND FEEDING FORMULAS)

Indicate per l'allevamento a mano di pappagalli



Pappa ad Alta Energia Plus (High Energy Plus Hand Feeding)

Questa pappa di continuazione è ideale per l'allevamento manuale di specie di pappagalli che hanno bisogno di diete particolarmente ricche di grassi come *Anodorhynchus hyacinthinus*, *Guaruba guarouba*, *Ara chloropterus*, *Ara ambiguus* e *cacatuidi neri* delle specie *Probosciger* e *Calyptorhynchus*. Dovrebbe essere somministrata dal momento in cui iniziano a spuntare le piume fino allo svezzamento.

Contiene olio di cocco grezzo, il grasso vegetale più adatto a queste specie e papaia, che favorisce il transito digestivo.

L'assunzione giornaliera varia tra 7-10 ml di formula per ogni 100 g di peso corporeo per sessione di alimentazione. Il numero di sessioni di alimentazione al giorno dipenderà dall'età e dalla specie del pappagallo. Nel caso dell'ara rossa e verde, ad esempio, questo prodotto dovrebbe essere introdotto progressivamente a partire dalle 4-5 settimane di vita.

Componenti analitici: Proteina grezza 17,0 %, Grassi grezzi 25,0 %.

Confezioni: sacco da 5 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 9-14 e 59-60.



PAPPE DA IMBECCO (HAND FEEDING FORMULAS)

Indicate per l'allevamento a mano di pappagalli



Pappa ad Alta Proteina (High Protein Hand Feeding)

Questa pappa di continuazione è ideale per l'allevamento manuale di specie di pappagalli che hanno bisogno di diete a medio e basso contenuto di grassi come quelle dei generi *Amazona*, *Pionus*, *Psittacula*, *Pyrrhura* e *Pionites leucogaster*. Dovrebbe essere somministrata dal momento in cui iniziano a spuntare le piume fino allo svezzamento.

Contiene olio di girasole alto-oleico stabile che ha il livello di acidi grassi adatto per queste specie. Contiene anche papaia, che favorisce il transito digestivo.

L'assunzione giornaliera varia tra 7-10 ml di formula per ogni 100 g di peso corporeo per sessione di alimentazione. Il numero di sessioni di alimentazione al giorno dipenderà dall'età e dalla specie del pappagallo. Nel caso dei pappagalli amazzonici, ad esempio, questo prodotto dovrebbe essere introdotto progressivamente a partire dalle 3 settimane di vita.

Componenti analitici: Proteina grezza 21,0 %, Grassi grezzi 10,0 %.

Confezioni: sacchi da 1 kg e 5 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 9-14 e 59-60.



PAPPE DA IMBECCO (HAND FEEDING FORMULAS)

Indicate per l'allevamento a mano di pappagalli



Pappa per Lory (Lory Special Hand Feeding)

Questa pappa di continuazione è ideale per l'allevamento dei pulcini della tribù dei Loriini. Dovrebbe essere somministrata dal momento in cui iniziano a spuntare le piume fino allo svezzamento.

Contiene polline e fiori di ibisco disidratati che contengono antiossidanti. Contiene anche papaia, che favorisce il transito digestivo.

L'assunzione giornaliera varia tra 10-16 ml di formula per ogni 100 g di peso corporeo per sessione di alimentazione. Il numero di sessioni di alimentazione al giorno dipenderà dall'età e dalla specie del pappagallo. Questo prodotto dovrebbe essere introdotto progressivamente a partire dalle 2 settimane di vita.

Componenti analitici: Proteina grezza 20,0 %, Grassi grezzi 14,0 %.

Confezioni: sacchi da 1 kg e 5 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 9-14 e 59-60.



PAPPE DA IMBECCO (HAND FEEDING FORMULAS)

Indicate per l'allevamento a mano di pappagalli



Pappa per Pappagalli (Parrot Hand Feeding)

Questa pappa di continuazione è una formula versatile per l'allevamento manuale di pappagalli comuni come quelli delle specie *Psittacula*, *Rosella*, *Aratinga*, *Pionites*, *Pyrrhura* e *Myiopsitta monachus*. Non è adatta a specie che abbiano un elevato fabbisogno di grassi o a specie appartenenti alla famiglia dei Cacatuidi (cacatue) e alla tribù dei Loriini (lori e lorichetti). Dovrebbe essere somministrata dal momento in cui iniziano a spuntare le piume fino allo svezzamento.

Contiene olio di girasole alto-oleico stabile che ha il livello di acidi grassi adatto per queste specie. Contiene anche papaia, che favorisce il transito digestivo.

L'assunzione giornaliera varia tra 7-10 ml di formula per ogni 100 g di peso corporeo per sessione di alimentazione. Il numero di sessioni di alimentazione al giorno dipenderà dall'età e dalla specie del pappagallo. Questo prodotto dovrebbe essere introdotto progressivamente a partire dai 10 ai 15 giorni di vita.

Componenti analitici: Proteina grezza 22,0 %, Grassi grezzi 14,0 %.

Confezioni: sacchi da 1 kg e 5 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 9-14 e 59-60.



PAPPE DA IMBECCO (HAND FEEDING FORMULAS)

Indicate per l'allevamento a mano di pappagalli



Pappa Mini (Mini Hand Feeding)

Questa pappa di continuazione è ideale per l'allevamento a mano di pappagalli di piccole dimensioni di specie come *Melopsittacus*, *Nymphicus*, *Agapornis*, *Neophema* e *Eolophus*. Dovrebbe essere somministrata dal momento in cui iniziano a spuntare le piume fino allo svezzamento.

Contiene uova intere disidratate e livelli di fibre e minerali adeguati alle esigenze di queste specie.

L'assunzione giornaliera varia tra 10-16 ml di formula per ogni 100 g di peso corporeo per sessione di alimentazione. Il numero di sessioni di alimentazione al giorno dipenderà dall'età e dalla specie del pappagallo. Nelle calopsitte, ad esempio, questo prodotto dovrebbe essere introdotto progressivamente a partire dalle 2 settimane di vita.

Componenti analitici: Proteina grezza 21,5 %, Grassi grezzi 10,0 %.

Confezioni: sacchetti da 350 g, 1 kg e 5 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 9-14 e 59-60.



PAPPE DA IMBECCO (HAND FEEDING FORMULAS)

Indicate per l'allevamento a mano di pappagalli



Pappa per Cacatua (Cockatoo Special Hand Feeding)

Questa pappa di continuazione è ideale per l'allevamento dei pulli di cacatuidi. Non è adatta per i cacatuidi neri dei generi *Probosciger* e *Calyptorhynchus* e per *Cacatua moluccensis*. Per queste specie dovrebbero essere usati rispettivamente **High Energy Plus Hand Feeding** e **High Energy Hand Feeding**. Dovrebbe essere somministrata dal momento in cui iniziano a spuntare le piume fino allo svezzamento.

Contiene il livello ottimale di fibra efficace per il benessere dell'apparato digerente di queste specie.

L'assunzione giornaliera varia tra 7-10 ml di formula per ogni 100 g di peso corporeo per sessione di alimentazione. Il numero di sessioni di alimentazione al giorno dipenderà dall'età e dalla specie del pappagallo. Questo prodotto dovrebbe essere introdotto progressivamente a partire dalle 3 settimane di vita.

Componenti analitici: Proteina grezza 21,0 %, Grassi grezzi 10,0 %.

Confezioni: sacchi da 1 kg e 5 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 9-14 e 59-60.



PAPPE DA IMBECCO (HAND FEEDING FORMULAS)

Indicate per l'allevamento a mano di pappagalli



Pappa per Eclectus (Eclectus Special Hand Feeding)

Questa pappa di continuazione è ideale per l'allevamento dei pulli di pappagallo *Eclectus*. Dovrebbe essere somministrata dal momento in cui iniziano a spuntare le piume fino allo svezzamento.

Contiene alti livelli di beta-carotene e fiori di ibisco disidratati che contengono antiossidanti. Contiene anche papaia, che favorisce il transito digestivo.

L'assunzione giornaliera varia tra 7-10 ml di formula per ogni 100 g di peso corporeo per sessione di alimentazione. Il numero di sessioni di alimentazione al giorno dipenderà dall'età e dalla specie del pappagallo. Questo prodotto dovrebbe essere introdotto progressivamente a partire dalle 3 settimane di vita.

Componenti analitici: Proteina grezza 20,0 %, Grassi grezzi 15,0 %.

Confezioni: sacchi da 1 kg e 5 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 9-14 e 59-60.



PAPPE DA IMBECCO (HAND FEEDING FORMULAS)

PAPPE DA IMBECCO (HAND FEEDING FORMULAS)

Indicate per l'allevamento a mano di pappagalli



General Recovery

Questa formula è un alimento di sostegno ideale per psittacidi malati e feriti.

È una formula completa progettata per essere una fonte di energia e nutrienti facilmente assimilabili in grado di agevolare la guarigione dell'uccello. L'uso di questa formula aiuta a prevenire la disidratazione e a mantenere il tono vitale degli animali in via di guarigione. A causa del suo alto contenuto di zuccheri, non dovrebbe essere somministrata a uccelli con candidosi del gozzo.

L'assunzione giornaliera dipenderà dalle condizioni, dall'età e dalla specie del pappagallo.

Componenti analitici: Proteina grezza 35,0 %, Grassi grezzi 19,0 %.

Confezioni: barattoli da 100 g e 700 g.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 9-14 e 59-60.

Sonde Alimentari

I tubi morbidi sono il metodo più sicuro e più pulito per somministrare formule per l'alimentazione manuale ai pappagalli fin dai primi giorni di vita. La loro punta arrotondata permette ai pulli di ingoiare comodamente e volontariamente.

I tubi morbidi sono disponibili in una gamma di diametri adatti alle diverse specie di pappagalli e fasi di sviluppo.

Per i pappagalli cenerini africani:

Il Tubo da 5 ml è adatto per l'alimentazione con pappe da imbecco di pulli che abbiano fino a 7 giorni di vita.

Il Tubo da 10 ml è adatto per pulli di fino a 14 giorni.

Il Tubo da 20 ml è adatto fino a 4 settimane.

Dal primo mese in poi, è consigliato il Tubo da 50 ml.

Per le calopsitte:

Il Tubo da 10 ml viene utilizzato quando spuntano le prime piume, proprio quando i puli vengono solitamente rimossi dal nido.

Alcuni giorni dopo è consigliato il Tubo da 20 ml.

Dimensioni: 5 ml, 10 ml, 20 ml e 50 ml.



Formula per
pappagalli giovani

Formula di mantenimento

Formula allevatori

Prodotti
complementari



Pappagallo cenerino
Ara
Pappagallo del Capo



Omega



High Energy



Omega



Parrot
Maintenance



Parrot
Breeder



High Energy
Breeding



Calcium Grit Coarse



Silex Grit Coarse



Cacatua Rosa - Amazona
Pappagallo Testablu
Parrocchetto dal collare



Omega



High Protein



Parrot
Maintenance



Parrot
Breeder



High Protein
Breeding



Calcium Grit Coarse



Silex Grit Coarse



Pappagallo Eclettico



Fruit



Omega



High Energy
Breeding



Fruit



Omega



High Energy
Breeding



Calcium Grit Coarse



Silex Grit Coarse



Cornuto Capoaazzurro
Calopsitta
Cacatua Rosa - Rosella Cremisi



Mini



Microspheres® 20/10



Eggfood



Calcium Grit Fine



Silex Grit Coarse



Parrocchetto Guanceverdi
Kakariki - Inseparabile di Fisher
Pappagallo del Pacifico



Minor



Microspheres® 20/10



Eggfood



Calcium Grit Fine



Silex Grit Fine



Pappagallo Turchese
Calopsitta
Parrocchetto Ondulato



Micro



Microspheres® 20/10



Eggfood



Calcium Grit Fine



Silex Grit Fine



Trichoglossus Stephens
Parrocchetto ondulato



Lory Gel+Lory Nectar



Lory Diet



Lory Pearls



Lory Gel



Frugivorous Neonatal
Hand Feeding



Calcium Grit Fine



Silex Grit Fine

FORMULE DI MANTENIMENTO

Ideale per l'alimentazione fuori della stagione riproduttiva

Le **Formule di mantenimento** sono ideali per uccelli domestici e riproduttori al di fuori della stagione riproduttiva. Le **Formule di mantenimento** sono composizioni complete consigliate per uccelli non riproduttori e per coppie riproduttrici fuori della stagione riproduttiva. Ogni granulo di pellet contiene tutti i nutrienti necessari. Questo evita il comune problema della selezione, in quanto i pellet vengono consumati come unità nutrizionali complete. Le **Formule di mantenimento** sono progettate per costituire il 100 % della dieta dell'uccello, sebbene altri alimenti come frutta e verdura fresca possano essere utilizzati per migliorare la varietà alimentare, l'arricchimento, l'attività e i comportamenti naturali. È importante assicurarsi che la dieta di mantenimento di **PSITTACUS** non sia inferiore al 70 % della dieta dell'uccello.

Lory Gel e **Lory Nectar** dovrebbero essere usati come due prodotti complementari ideali per nutrire i Loriini. Si trovano anche nella sezione dedicata alle formule di mantenimento.

Lory Diet è un alimento completo con caratteristiche intermedie tra **Gel** e **Nectar** che può essere offerto come alimento base alla maggior parte dei **Loriini**.

Infine, **Lory Pearls** è un prodotto per una dieta microestrusa completa per Loriini.

RACCOMANDAZIONI PER FORMULE DI MANTENIMENTO



Dimensioni reali



Integrare con frutta e verdura fresca per aggiungere varietà alla dieta.



Rinnovare la mangiatoia con cibo fresco ogni giorno.



Non aggiungere altre vitamine od oligoelementi poiché la formula ne contiene già la quantità adeguata. Somministrarne in eccesso può essere dannoso.



Verificare che l'uccello abbia sempre acqua pulita e fresca in abbondanza.



Chiudere la confezione dopo ogni utilizzo.

FORMULE DI MANTENIMENTO

Indicate per gli stadi di inattività riproduttiva



Alta Energia (High Energy)

Questa formula di mantenimento è ideale per le specie che, allo stato selvatico, consumano una notevole quantità di frutti e semi di piante oleaginose come quelle dei generi *Psittacus*, *Ara* e *Poicephalus*.

Contiene un alto livello di grassi con un livello di acidi grassi adatto a queste specie.

L'assunzione giornaliera varia dal 5 % al 12 % del peso corporeo dell'uccello. Le specie di taglia media, come il pappagallo cenerino africano, ne consumano tra i 25 g e i 45 g al giorno. La temperatura dell'ambiente ne influenza il consumo.

Componenti analitici: Proteina grezza 17,0 %, Grassi grezzi 11,0 %.

Confezioni: sacchi da 800 g, 3 kg e 12 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 29-31 e 61-62.



Diametro: 12 mm (+/- 10 %)

Lunghezza: 8 mm (+/- 10 %)



FORMULE DI MANTENIMENTO

Indicate per gli stadi di inattività riproduttiva



Alta Proteina (High Protein)

Questa formula di mantenimento è ideale per le specie che, allo stato selvatico, consumano una notevole quantità di frutti e semi con un contenuto di grassi basso o moderato come quelle dei generi *Amazona*, *Cacatua*, *Psittacula*, *Pionites* e *Pionus menstruus*.

Contiene il livello di proteine corretto e gli acidi grassi specifici che corrispondono al profilo nutritivo degli alimenti selvatici per queste specie.

L'assunzione giornaliera varia dal 5 % al 15 % del peso corporeo dell'uccello. Le specie di taglia media, come l'amazzone dalla fronte blu, ne consumano tra i 20 g e i 40 g al giorno. La temperatura dell'ambiente ne influenza il consumo.

Componenti analitici: Proteina grezza 21,5 %, Grassi grezzi 8,0 %.

Confezioni: sacchi da 800 g , 3 kg e 12 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 29-31 e 61-62.



FORMULE DI MANTENIMENTO

Indicate per gli stadi di inattività riproduttiva



Mini

Questa formula di mantenimento è ideale per specie di piccola taglia come quelle dei generi *Nymphicus*, *Eolophus*, *Platycercus*, *Aratinga* e *Psittacula* che in natura consumano principalmente semi con bassi livelli di grassi.

Contiene un alto livello di amido e un basso livello di grassi per soddisfare i fabbisogni di questo gruppo di specie. Include anche uovo intero essiccato.

L'assunzione giornaliera varia dal 9 % al 15 % del peso corporeo dell'uccello. Una calopsitta, ad esempio, ne consumerà tra i 7 e i 15 g. La temperatura dell'ambiente ne influenza il consumo.

Componenti analitici: Proteina grezza 15,1 %, Grassi grezzi 7,5 %.

Confezioni: sacchi da 450 g , 3 kg e 12 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 29-31 e 61-62.



FORMULE DI MANTENIMENTO

Indicate per gli stadi di inattività riproduttiva



Minor

Questa formula di mantenimento è ideale per uccelli psittacidi di piccola taglia come quelli dei generi *Agapornis*, *Cyanoramphus*, *Pyrrhura* e *Forpus* che in natura consumano una grande varietà di alimenti, inclusi semi, frutta, bacche, foglie, germogli e persino alcuni invertebrati.

È una dieta microestrusa che contiene il profilo nutritivo adatto a coprire i fabbisogni di queste specie caratterizzate da una strategia di alimentazione così ampia.

L'assunzione giornaliera varia dal 10 % al 18 % del peso corporeo dell'uccello. La temperatura dell'ambiente ne influenza il consumo.

Componenti analitici: Proteina grezza 18,0 %, Grassi grezzi 10,0 %.

Confezioni: sacchi da 450 g , 3 kg e 12 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 29-31 e 61-62.

FORMULE DI MANTENIMENTO

Indicate per gli stadi di inattività riproduttiva



Micro

Questa formula di mantenimento è ideale per specie di piccola taglia come quelle dei generi *Melopsittacus*, *Nymphicus*, *Psephotus*, *Neophema* e *Platycercus* che consumano principalmente semi di erbe.

È una formula sbriciolata che contiene un livello elevato di amido e un livello moderato di calcio per imitare la composizione dei semi che queste specie consumano in natura.

L'assunzione giornaliera è di circa il 10 % del peso corporeo dell'uccello nel caso delle calopsitte e fino al 18 % nel caso di pappagallini comuni. La temperatura dell'ambiente ne influenza il consumo.

Componenti analitici: Proteina grezza 16,0 %, Grassi grezzi 7,5 %.

Confezioni: sacchi da 350 g , 1 kg e 5 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 29-31 e 61-62.



FORMULE DI MANTENIMENTO

Indicate per gli stadi di inattività riproduttiva



Omega

Questa formula è ideale per esemplari giovani di specie medie e grandi fino a un anno di vita. Può anche essere somministrato da solo o come complemento a esemplari adulti di generi come *Ara*, *Psittacus*, *Poicephalus* e *Eclectus*. Nel caso degli *Eclectus*, **Omega** deve essere integrato con abbondante frutta dolce. Altre specie come quelle dei generi *Amazona*, *Cacatua* o *Psittacula* che tendono ad aumentare di peso, dovrebbero essere fatte passare alla formula di mantenimento appropriata dopo 1 anno.

Grazie alla sua alta appetibilità, il mangime **Omega** è il prodotto ideale per la transizione degli uccelli dalle formule per l'alimentazione manuale al mangime estruso. Viene anche utilizzato per far passare gli uccelli da una dieta a base di semi a una a base di pellet.

L'assunzione giornaliera varia dal 5 % al 10 % del peso corporeo dell'uccello. Le specie di taglia media, come il pappagallo cenerino africano, ne consumano tra i 35 g e i 45 g al giorno. La temperatura dell'ambiente ne influenza il consumo.

Componenti analitici: Proteina grezza 23,5 %, Grassi grezzi 15,0 %.

Confezioni: sacchi da 800 g, 3 kg e 12 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 29-31 e 61-62.



Diámetro: 8,5 mm (0 21/64 in) (+/- 10 %)
Longitud: 17 mm (0 43/64 in) (+/- 10 %)

FORMULE DI MANTENIMENTO

Indicate per gli stadi di inattività riproduttiva

RACCOMANDAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE PER LORY GEL, LORY NECTAR, LORY DIET E LORY PEARLS.



Dimensioni reali



Offri **Lory Gel** e **Lory Nectar** allo stesso tempo ma in mangiatoie separate. Gli uccelli consumeranno la quantità richiesta di ogni formula in base alle proprie esigenze nutrizionali.



Quando vi siano puli nel nido, si raccomanda che gli uccelli abbiano a disposizione anche Frugivorous Neonatal Hand-feeding o Lory Special Hand-feeding, a seconda della loro età.



Si raccomanda di offrire gli alimenti asciutti, senza aggiunta di acqua. Ciò migliorerà la consistenza degli escrementi degli uccelli. Tuttavia, è anche possibile mescolare il cibo con acqua fino ad ottenere una consistenza cremosa.



Le **Lory Pearls** dovrebbero essere somministrate secche ma è consigliabile offrire molta frutta dolce per completare la dieta.



Integrare con frutta fresca per aggiungere varietà alla dieta.



Rinnovare il cibo secco ogni giorno. Se offerto mescolato con acqua, il cibo deve essere rinnovato entro poche ore per evitarne il deterioramento.



Non aggiungere altre vitamine od oligoelementi poiché la formula ne contiene già la quantità adeguata. Somministrarne in eccesso può essere dannoso.



Verificare che l'uccello abbia sempre acqua pulita e fresca in abbondanza.

Chiudere la confezione dopo ogni utilizzo.

FORMULE DI MANTENIMENTO

Indicate per gli stadi di inattività riproduttiva



Lory Gel

Questa formula di mantenimento è ideale per i pappagalli della tribù dei Loriini (lori e lorichetti).

Per un'alimentazione premium consigliamo di offrire entrambi i prodotti, **Lory Gel** e **Lory Nectar**, in mangiatoie separate. Gli uccelli consumeranno la quantità richiesta di ogni prodotto in base alle proprie esigenze nutrizionali. Durante la stagione riproduttiva, l'assunzione di **Lory Gel** sarà più elevata. Contiene un livello più alto di proteine.

L'assunzione giornaliera varia da 8 a 16 g di **Gel** e **Nectar** senza acqua per ogni 100 g di peso corporeo. La temperatura dell'ambiente ne influenza il consumo.

Componenti analitici: Proteina grezza 17,0 %, Grassi grezzi 8,0 %.

Confezioni: sacchi da 1 kg e 5 kg.

Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 29, 31, 38 e 61-62.



FORMULE DI MANTENIMENTO

Indicate per gli stadi di inattività riproduttiva



Lory Nectar

Questa formula di mantenimento è ideale per i pappagalli della tribù dei Loriini (lori e lorichetti).

Per un'alimentazione premium consigliamo di offrire entrambi i prodotti, **Lory Gel** e **Lory Nectar**, in mangiatoie separate. Gli uccelli consumeranno la quantità richiesta di ogni prodotto in base alle proprie esigenze nutrizionali. Durante la stagione riproduttiva, l'assunzione di **Lory Nectar** sarà più elevata. Contiene un livello più alto di zuccheri.

L'assunzione giornaliera varia da 8 a 16 g di **Gel** e **Nectar** senza acqua per ogni 100 g di peso corporeo. La temperatura dell'ambiente ne influenza il consumo.

Componenti analitici: Proteina grezza 7,0 %, Grassi grezzi 3,0 %.

Confezioni: sacchi da 1 kg e 5 kg.

Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 29, 31, 38 e 61-62.



FORMULE DI MANTENIMENTO

Indicate per gli stadi di inattività riproduttiva



Lory Diet

Questa formula di mantenimento è ideale per i pappagalli della tribù dei Loriini (lori e lorichetti).

È un alimento completo molto ricco di zuccheri e contiene polpa di mela disidratata, polline e uovo intero essiccato.

L'assunzione giornaliera varia da 8 a 16 g di **Lory Diet** senza acqua per ogni 100 g di peso corporeo. La temperatura dell'ambiente ne influenza il consumo.

Componenti analitici: Proteina grezza 13,0 %, Grassi grezzi 5,0 %.

Confezioni: sacchi da 5 kg e 15 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 29, 31, 38 e 61-62.



FORMULE DI MANTENIMENTO

Indicate per gli stadi di inattività riproduttiva



Lory Pearls

Questa formula di mantenimento è ideale per i pappagalli della tribù dei Loriini (lori e lorichetti).

È un alimento microestruso completo. Contiene polpa di mela disidratata. Si consiglia offrirlo insieme ad abbondante frutta dolce.

L'assunzione di giornaliera varia da 8 a 16 g per ogni 100 g di peso corporeo. La temperatura dell'ambiente ne influenza il consumo.

Componenti analitici: Proteina grezza 16,0 %, Grassi grezzi 7,0 %.

Confezioni: sacchi da 800 g e 12 kg.


Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 29, 31, 38 e 61-62.



MANGIME ESTRUSO MULTISPECIE

Per specie di pappagalli di medie e grandi dimensioni

Le **Formule multispecie** sono alimenti generici, non specifici, adatti a diverse specie di pappagalli di medie e grandi dimensioni (*Amazona*, *Psittacus*, *Cacatua*, *Ara*, *Aratinga*).



Dimensioni reali

RACCOMANDAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE PER PARROT MAINTENANCE



Consigliato per uccelli non riproduttori e per coppie riproduttrici fuori della stagione riproduttiva.



Integrare con frutta e verdura fresca per aggiungere varietà alla dieta.



Rinnovare la mangiatoia con cibo fresco ogni giorno.



Non aggiungere altre vitamine od oligoelementi poiché la formula ne contiene già la quantità adeguata. Somministrarne in eccesso può essere dannoso.



Verificare che l'uccello abbia sempre acqua pulita e fresca in abbondanza.



Chiudere la confezione dopo ogni utilizzo.

RACCOMANDAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE PER PARROT BREEDER



Consigliato gli uccelli riproduttori durante la stagione riproduttiva.



Integrare con frutta e verdura fresca per aggiungere varietà alla dieta.



Rinnovare la mangiatoia con cibo fresco ogni giorno.



Non aggiungere altre vitamine od oligoelementi poiché la formula ne contiene già la quantità adeguata. Somministrarne in eccesso può essere dannoso.



Verificare che l'uccello abbia sempre acqua pulita e fresca in abbondanza.



Chiudere la confezione dopo ogni utilizzo.

MANGIME ESTRUSO MULTISPECIE

Per specie di pappagalli di medie e grandi dimensioni



Parrot Maintenance

Questa versatile formula di mantenimento è ideale per un gruppo eterogeneo di specie di pappagalli di medie e grandi dimensioni come quelle dei generi *Psittacus*, *Ara*, *Amazona*, *Cacatua*, *Pionites*, *Pionus*, *Myiopsitta* e *Psittacula*.

È pensata per soddisfare le esigenze nutrizionali di un'ampia varietà di specie fuori della stagione riproduttiva. Questo prodotto si distingue per la sua appetibilità ed è accettato dagli uccelli fin dal primo momento.

L'assunzione giornaliera varia dal 5 % al 12 % del peso corporeo dell'uccello. La temperatura dell'ambiente ne influenza il consumo.

Componenti analitici: Proteina grezza 15,5 %, Grassi grezzi 7,0 %.

Confezioni: sacchi da 3 kg e 15 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 29-30, 43 e 61-62.



Diametro: 6 mm (+/- 10 %)

Lunghezza: 7 mm (+/- 10 %)



MANGIME ESTRUSO MULTISPECIE

Per specie di pappagalli di medie e grandi dimensioni



Parrot Breeder

Questa versatile formula per la riproduzione è ideale per un gruppo eterogeneo di specie di pappagalli di medie e grandi dimensioni come quelle dei generi *Psittacus*, *Ara*, *Amazona*, *Cacatua*, *Pionites*, *Pionus*, *Myiopsitta* e *Psittacula*.

È pensato per soddisfare le accresciute esigenze nutrizionali di un'ampia varietà di specie durante la fase riproduttiva e per stimolare e facilitare la riproduzione. Questo prodotto si distingue per la sua appetibilità ed è accettato dagli uccelli fin dal primo momento.

L'assunzione giornaliera varia dal 5 % al 12 % del peso corporeo. La temperatura dell'ambiente ne influenza il consumo.

Componenti analitici: Proteina grezza 21,6 %, Grassi grezzi 11,0 %.

Confezioni: sacchi da 3 kg e 15 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 29-30, 43 e 61-62.




SPECIALE ALLEVATORI

INDICATO PER STIMOLARE LA RIPRODUZIONE

Le **formule da allevamento** sono formule complete consigliate per gli uccelli riproduttori durante la stagione riproduttiva. Ogni granulo di pellet contiene tutti i nutrienti necessari. Questo evita il comune problema della selezione, in quanto i pellet vengono consumati come unità nutrizionali complete. Le **Formule per l'allevamento** sono progettate per costituire il 100% della dieta dell'uccello, sebbene altri alimenti come frutta e verdura fresca possano essere utilizzati per migliorare la varietà di una dieta arricchita, l'addestramento e i comportamenti naturali. È importante assicurarsi che la formula riproduttiva Psittacus non sia inferiore al 70 % della dieta dell'uccello. Questi alimenti sono stati appositamente studiati per stimolare la riproduzione.

Le **formule per l'allevamento** contengono alti livelli di proteine con un livello aminoacidico adatto a questa fase della vita. Particolare attenzione è stata posta sul loro livello di acidi grassi e sui contenuti di Omega-6 e Omega-3. La concentrazione di vitamine e antiossidanti di queste formule è molto superiore a quella delle formule di mantenimento per coprire le maggiori esigenze nutrizionali del periodo di riproduzione.

RACCOMANDAZIONI PER FORMULE DI RIPRODUZIONE



Dimensioni reali



Formule destinate alle coppie riproduttrici durante la stagione riproduttiva.



Integrare con frutta e verdura fresca per aggiungere varietà alla dieta.



Rinnovare la mangiatoia con cibo fresco ogni giorno.

Non aggiungere altre vitamine od oligoelementi poiché la formula ne contiene già la quantità adeguata. Somministrarne in eccesso può essere dannoso. Tuttavia abbiamo raccomandato che gli uccelli riproduttori abbiano sempre disponibile **Calcium Grit**, questo consentirà loro di soddisfare l'aumento del fabbisogno di calcio della deposizione delle uova.



Verificare che l'uccello abbia sempre acqua pulita e fresca in abbondanza.



Chiudere la confezione dopo ogni utilizzo.

FORMULE ALLEVATORI

Indicate per stimolare la riproduzione



Allevamento Alta Energia (Breeding High Energy)

Questa formula per la riproduzione è ideale per le specie che, allo stato selvatico, consumano una notevole quantità di frutti e semi di piante oleaginose come quelle dei generi *Psittacus*, *Ara* e *Poicephalus*.

Contiene proteine di alta qualità e un tipo di acidi grassi **ricco di acido palmitico** per stimolare e supportare la riproduzione.

L'assunzione giornaliera varia dal 5 % al 10 % del peso corporeo dell'uccello. Le specie di taglia media, come il pappagallo cenerino africano, ne consumano tra i 25 g e i 45 g al giorno. La temperatura dell'ambiente ne influenza il consumo.

Componenti analitici: Proteina grezza 23,5 %, Grassi grezzi 15,0 %.

Confezioni: sacco da 12 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 29, 30, 46 e 61-62.



Diametro: 8,5 mm (+/- 10 %)

Lunghezza: 8,5 mm (+/- 10 %)



FORMULE ALLEVATORI

Indicate per stimolare la riproduzione



Allevamento Alta Proteina (Breeding High Protein)

Questa formula per la riproduzione è ideale per le specie che, allo stato selvatico, consumano una notevole quantità di frutti e semi con un contenuto di grassi basso o moderato come quelle dei generi *Amazona*, *Cacatua*, *Psittacula*, *Pionites* e *Pionus menstruus*.

Contiene proteine di alta qualità e un tipo di acidi grassi **ricco di acido oleico** per stimolare e supportare la riproduzione.

L'assunzione giornaliera varia dal 5 % al 10 % del peso corporeo dell'uccello. Un'amazzone dalla fronte blu, ad esempio, ne consumerà tra i 20 g e i 35 g al giorno. La temperatura dell'ambiente ne influenza il consumo.

Componenti analitici: Proteína bruta 24,5 %, Grasa bruta 12,0 %.

Confezioni: sacco da 12 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 29, 30, 46 e 61-62.



Diametro: 9,5 mm (+/- 10 %)

Lunghezza: 7 mm (+/- 10 %)



FORMULE ALLEVATORI

Indicate per stimolare la riproduzione

RACCOMANDAZIONI DI UTILIZZO DELLE MICROSPHERES® 20/10




Dimensioni reali

Le **Microspheres® 20/10** sono state studiate per fornire una rapida idratazione mantenendo intatta la loro forma sferica.

Possono essere offerte umide o secche. Come alimento umido, sono eccellenti per stimolare le coppie riproduttive a nutrire i loro pulli. Le **Microspheres® 20/10** possono essere offerte anche mescolate con altri alimenti, come ad esempio **Psittacus Eggfood** o verdure tritate. Aggiungere solo l'acqua sufficiente a creare una miscela umida, sciolta e non appiccicosa poiché questa è la consistenza preferita dagli uccelli.

COME PREPARARE MICROSPHERES® 20/10



- 1 Versare due parti di **Microspheres® 20/10** in un contenitore.
- 2 Aggiungere circa 1 terzo di acqua e mescolare.
- 3 Lasciar riposare per almeno di 15 minuti.
- 4 Mescolare il composto e servire direttamente, oppure aggiungere **Eggfood** secco e/o verdure. La quantità di acqua utilizzata per idratare **Microspheres® 20/10** dipenderà dalla quantità di **Eggfood** secco aggiunto.



Come preparare
Microspheres ®

FORMULE ALLEVATORI

Indicate per stimolare la riproduzione



Microspheres® 20/10

Questa formula per la riproduzione è ideale per piccoli pappagalli come quelli dei generi *Nymphicus*, *Pyrrhura*, *Agapornis*, *Melopsittacus*, *Aratinga*, *Psittacula*, *Eolophus*, *Platyercus*, *Cyanoramphus*, *Forpus*, *Neophema* e *Psephotus*. Studiata per integrare la dieta delle coppie riproduttive durante la crescita dei pulli.

È una formula microestrusa ricca e particolarmente indicata durante la stagione riproduttiva quando dovrebbe essere utilizzata come base umida per **Eggfood**.

Questo mix va offerto, in aggiunta alla formula di mantenimento per stimolare la riproduzione e in presenza di.

Essendo stato formulato come alimento completo, non ci sono condizioni di consumo e può essere offerto tutte le volte che si vuole. La temperatura dell'ambiente ne influenza il consumo..

Componenti analitici: Proteina grezza 20,0 %, Grassi grezzi 10,0 %.

Confezioni: sacchi da 800 g e 3 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 29, 30, 49 e 61-62.



Diametro: 2,5 mm (+/- 10 %)



FORMULE ALLEVATORI

Indicate per stimolare la riproduzione

RACCOMANDAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE PER EGGFOOD

EGGFOOD

Dimensioni reali



Psittacus Eggfood è una dieta equilibrata, destinata ad essere utilizzata come supplemento per le coppie riproduttive con pulcini.


+ FORMULA



Non utilizzare come dieta esclusiva.



Offrilo secco in una mangiatoia separata o mescolato con **Microspheres® 20/10** idratate.



Rinnovare la mangiatoia con cibo fresco ogni giorno.



Non aggiungere altre vitamine od oligoelementi poiché la formula ne contiene già la quantità adeguata. Somministrarne in eccesso può essere dannoso.

⑦



Verificare che l'uccello abbia sempre acqua pulita e fresca a disposizione.



Chiudere la confezione dopo ogni utilizzo.

FORMULE ALLEVATORI

Indicate per stimolare la riproduzione



Eggfood

Questa formula è ideale per specie piccole come quelle dei generi *Nymphicus*, *Pyrrhura*, *Agapornis*, *Melopsittacus*, *Aratinga*, *Psittacula*, *Eolophus*, *Platyercus*, *Cyanoramphus*, *Forpus*, *Neophema* e *Psephotus*. Studiata per integrare la dieta delle coppie riproduttive durante la crescita dei pulli.

Eggfood è ricco di uova intere essiccate. Può essere offerto secco o miscelato con **Microspheres® 20/10** idratate. Questo mix va offerto in aggiunta alla formula di mantenimento per stimolare la riproduzione e soprattutto quando ci sono pulcini. Si consiglia di non utilizzarlo come dieta esclusiva.

L'assunzione giornaliera varierà notevolmente a seconda del numero e dello stadio di sviluppo dei piccoli.

Componenti analitici: Proteina grezza 22,0 %, Grassi grezzi 15,0 %.

Confezioni: sacchi da 1 kg e 5 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 29, 30, 51 e 61-62.



PRODOTTI COMPLEMENTARI


In **PSITTACUS** concentriamo tutti i nostri sforzi nello sviluppo di alimenti completi e specifici che garantiscano un'alimentazione ottimale ed equilibrata. Ciononostante, in alcuni casi la somministrazione di alcuni alimenti complementari è raccomandata e importante, o addirittura necessaria.

È il caso delle graniglie di silicio e calcio. La somministrazione di sabbia silicea (**Silex Grit**) è essenziale perché garantisce il corretto funzionamento del ventriglio e del tubo digerente degli uccelli granivori, sia quando ingeriscono semi interi, sia quando consumano alimenti completi.

La disponibilità di **Calcium Grit** è particolarmente importante nelle specie di uccelli con grandi covate, in cui il fabbisogno di calcio può occasionalmente superare le quantità fornite dall'alimento completo stesso.

Un caso completamente diverso è quello del **Vitamin-Mineral**. L'uso di questo integratore è del tutto sconsigliato quando gli uccelli stanno ingerendo esclusivamente un alimento completo. D'altra parte, il suo utilizzo è altamente consigliabile nelle diete a base di miscele di semi, poiché sono di per sé carenti di alcuni nutrienti. Nelle diete miste di semi e pellet, il livello di inclusione di questo integratore nella dieta deve essere calcolato in base alla proporzione dell'uno o dell'altro tipo di alimento.

Sprouting Helper è un prodotto molto utile per chi prepara e somministra germogli. Facilita la loro preparazione e ne aumenta la durata.



Dimensioni reali

RACCOMANDAZIONI PER SILEX GRIT



Consigliamo che il nostro **Silex Grit** sia sempre disponibile in una mangiatoia separata per tutti gli uccelli che abbiano strategie di alimentazione granivora. Ciò è particolarmente importante nelle specie di piccola taglia altamente specializzate in diete a base di semi di erba.



Per le specie più grandi basterà aggiungere periodicamente (ogni 7-15 giorni) qualche grammo di **Silex Grit** alla dieta.



La versione Fine o Grossa dovrebbe essere scelta secondo la taglia della specie.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

RACCOMANDAZIONI PER CALCIUM GRIT



Calcium grit dovrebbe essere disponibile tutto l'anno. Il consumo è particolarmente elevato durante le fasi di deposizione nelle femmine e nei periodi di crescita negli esemplari giovani.



Si consiglia di somministrare in una mangiatoia separata. Calcium Grit grana grossa può anche essere mescolato con la dieta.



Chiudere la confezione dopo ogni utilizzo.

RACCOMANDAZIONI PER VITAMINE E MINERALI



Si consiglia di mescolare il prodotto con alimenti umidi, come semi germinati, frutta e verdura. Il prodotto deve aderire al mangime.



La dose giornaliera dovrebbe essere pari al 4% del peso secco dei semi somministrati.



La miscela umida arricchita con questo prodotto non dovrebbe essere disponibile per gli uccelli per più di 8 ore, o per un tempo anche minore in presenza di temperature ambiente più elevate.



Integra solo la parte non-bilanciata della dieta. La dieta di base che consiste per almeno il 70 % in una formula Psittacus completa non deve essere integrata.



Chiudere la confezione dopo ogni utilizzo.

RACCOMANDAZIONI PER SPROUTING HELPER



Riduce al minimo il rischio di crescita di funghi e batteri.



Aggiungilo all'acqua utilizzata per sciacquare e idratare i semi per la germinazione. Dose: 1-2 ml di Sprouting Helper per litro d'acqua.



Indicato per prolungare la vita potabile dell'acqua. Dose: 0,25-0,5 ml di per litro d'acqua.

Silex Grit Fine/Coarse (Grana Fine/Grossa)

Questo integratore è particolarmente indicato per piccoli uccelli psittacidi altamente granivori come quelli dei generi *Nymphicus*, *Pyrrhura*, *Agapornis*, *Melopsittacus*, *Aratinga*, *Psittacula*, *Eolophus*, *Platyercus*, *Cyanoramphus*, *Forpus*, *Neophema* e *Psephotus*. Tuttavia, è consigliato anche per altre specie granivore di taglia maggiore come quelle dei generi *Psittacus*, *Ara*, *Poicephalus*, *Amazona*, *Cacatua*, *Pionus*, *Psittacula* e *Eclectus*.

Questa graniglia di silicio viene prodotta alla dimensione ottimale: 0,8-1,2 mm per le specie piccole e 1-2 mm per le specie più grandi.

Il suo consumo è fondamentale per garantire un funzionamento ottimale del ventriglio e dell'apparato digerente in genere. La sua funzione è puramente meccanica e non va confusa con **Calcium Grits** che ha una funzione nutritiva come fonte di calcio. Contrariamente a quanto accade con la graniglia di calcio, **Silex Grit grana fine** e **Silex Grit grana grossa** sono insolubili e non vengono disciolti dagli acidi gastrici nel ventriglio.

Gli uccelli regoleranno la loro assunzione di **Silex Grit** secondo le loro esigenze. La quantità consumata dipenderà dalla specie e dalla dieta somministrata. Le specie altamente specializzate nel consumo di semi di erba richiederanno un maggiore apporto di **Silex Grit**.

Confezione Silex Grit Fine: Barattolo da 1 kg.

Confezione Silex Grit Coarse: Barattolo da 1,5 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 29, 30, 53, 54 e 59-60.

Grit Calcico Fine/Grossa (Calcium Grit Fine/Coarse)

Questi integratori sono una fonte di calcio ad assunzione volontaria per gli uccelli. **Calcium Grit grana fine** è ideato specialmente per specie piccole come quelle dei generi *Nymphicus*, *Pyrrhura*, *Agapornis*, *Melopsittacus*, *Aratinga*, *Psittacula*, *Eolophus*, *Platyercus*, *Cyanoramphus*, *Forpus*, *Neophema* e *Psephotus*. Invece, **Calcium Grit grana fine grossa** è progettato per specie di medie e grandi dimensioni come quelle dei generi *Psittacus*, *Ara*, *Poicephalus*, *Amazona*, *Cacatua*, *Psittacula*, *Eclectus* e *Pionus*. Sono stati progettati per correggere le carenze di calcio nelle miscele di semi e per provvedere all'aumento del fabbisogno di calcio durante la crescita e la deposizione delle uova. Gli uccelli sono perfettamente in grado di autoregolare l'assunzione di cibi ricchi di calcio in base alle loro esigenze.

L'assunzione giornaliera varia dallo 0% al 2% della dieta secca. **Calcium Grit** dovrebbe essere liberamente disponibile in una mangiatoia separata o può essere miscelato con gli altri ingredienti della dieta.

Componenti analitici: Calcio 37,7 % (fine), Calcio 37,5 % (grosso).

Confezione Calcium Grit Fine: sacco da 2 kg.

Confezione Calcium Grit Coarse: sacco da 8 kg.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 29, 30, 53, 54 e 59-60.



Vitamine e Minerali

Questo integratore è indicato per gli uccelli psittacidi granivori. Dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per integrare le diete a base di miscele di semi.

È ideale per correggere le carenze di vitamine, minerali e oligoelementi delle miscele di semi. Questo prodotto in polvere è studiato per essere aggiunto alla parte umida della dieta (germogli, semi bolliti, frutta e/o verdura). La miscela umida arricchita con questo prodotto non dovrebbe essere disponibile per gli uccelli per più di 8 ore. Se lasciato aperto per troppo tempo, inevitabilmente si formeranno escrescenze batteriche e fungine che potrebbero mettere a rischio la salute degli uccelli.

La dose giornaliera dovrebbe essere pari al 4% del peso secco dei semi somministrati.

Componenti analitici: Proteina grezza 30,0 %, Grassi grezzi 9,0 %.

Confezione: Barattoli da 100 g e 700 g.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 29, 30, 53, 54 e 59-60.



Sprouting Helper

Questo complemento è ideale per facilitare la produzione di germogli.

Contiene estratti di agrumi che riducono al minimo il rischio di crescita di funghi e batteri. È anche indicato per prolungare la vita potabile dell'acqua.

Per i germogli: Utilizzare una soluzione di 1-2 ml di Sprouting Helper per litro d'acqua.

Per acqua potabile: Utilizzare una soluzione di 0,25-0,5 ml di Sprouting Helper per litro d'acqua.

— Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 53-54.

Confezione: Flacone dosatore da 250 ml.



Formule per l'alimentazione manuale

Prodotti Complementari

Parametro	Unità	Psittacine Crop Milk	Frugivorous Psittacine Crop Milk	Neonatal Hand Feeding	Frugivorous Neonatal	High Energy HF	High Energy Plus HF	High Protein HF	Lory Special HF	Parrot HF	Mini HF	Cockatoo Special HF	Eclectus Special HF	General Recovery	Calcium Grit Fine	Calcium Grit Coarse	Silex Grit Fine/Coarse	Vitamin Mineral
Umidità	%	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	6,0	3,0	3,0	5,0	7,0
Energia metabolica	Kcal/Kg	4.920	4.370	3.710	3.720	3.800	3.900	3.210	3.390	3.530	3.190	3.130	3.470	3.910	0	0	0	2.600
Proteina cruda	%	44,0	39,0	24,0	29,0	18,0	17,0	21,0	20,0	22,0	21,5	21,0	20,0	35,0	0	0	0	30,0
Metionina	%	1,4	1,3	0,7	0,9	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,1	0	0	0	1,6
Lisina	%	2,9	2,5	1,5	1,8	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,2	1,2	1,1	2,2	0	0	0	1,1
Grassi grezzi	%	40,0	29,5	20,0	19,0	20,0	25,0	10,0	14,0	14,0	10,0	10,0	15,0	19,0	0	0	0	9,0
Fibra grezza	%	2,4	2,8	4,1	3,8	4,0	4,0	4,0	4,5	4,0	4,0	5,7	4,6	0,2	0	0	0	3,7
Cenere	%	6,7	6,7	6,9	5,4	8,0	8,0	7,0	5,7	7,0	7,0	5,9	5,8	5,9	95,5	95,5	95,0	17,0
Calcio	%	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,7	0,9	0,6	0,6	0,8	0,8	37,7	37,5	0	3,1
Fosforo disp.	%	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0	1,9
Vit. A retinolo	U.I./Kg	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.600	4.700	3.300	5.250	4.600	4.400	4.800	5.000	0	0	0	127.000
Vit. A attiva	U.I./Kg	125.000	100.000	65.000	55.000	90.000	25.000	45.000	50.000	46.900	35.000	35.000	65.000	50.000	0	0	0	540.000
Vit. D3	U.I./Kg	1.200	1.300	1.000	1.200	1.100	1.100	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.500	0	0	0	38.000
Vit. E	mg/Kg	300	330	300	300	300	300	250	240	270	270	270	300	500	0	0	0	10.000
Vit. C	mg/Kg	200	200	200	240	200	200	210	150	200	200	200	170	300	0	0	0	5.000
Vit. K3	mg/Kg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0	0	0	125
Vit. B1	mg/Kg	25	25	25	25	25	25	25	22	39	25	25	25	40	0	0	0	800
Vit. B2	mg/Kg	20	20	20	20	20	20	20	17	30	20	20	20	30	0	0	0	700
Vit. B6	mg/Kg	25	25	25	25	25	25	25	22	35	25	25	25	35	0	0	0	800
Vit. B12	mcg/Kg	100	100	100	100	100	100	100	85	120	100	100	100	120	0	0	0	3.000
Acido pantotenico	mg/Kg	20	20	20	20	20	20	20	17	30	20	20	20	30	0	0	0	700
Acido nicotinico	mg/Kg	125	125	125	125	125	125	125	105	130	125	125	125	130	0	0	0	3.200
Acido folico	mg/Kg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	7,0	5,0	5,0	5,0	7,0	0	0	0	160
Biotina	mcg/Kg	800	800	800	800	800	800	800	700	1.000	800	800	800	1.100	0	0	0	25.000
Colina	mg/Kg	1.400	1.600	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700	1.200	1.900	1.700	1.600	1.400	1.800	0	0	0	45.000
B-carotene	mg/Kg	70	60	40	33	50	12	25	30	25	18	18	37	27	0	0	0	250
Manganese	mg/Kg	65	65	60	69	70	78	81	57	89	79	77	78	79	0	0	0	1.780
Iodio	mg/Kg	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0	0	0	25
Zinco	mg/Kg	56	50	56	52	54	77	56	47	72	54	56	50	45	0	0	0	770
Ferro	mg/Kg	105	106	169	153	168	172	166	110	229	143	133	140	125	0	0	0	1.280
Rame	mg/Kg	6,0	6,0	7,0	6,0	7,0	7,0	8,0	6,0	9,0	8,0	7,0	6,0	6,0	0	0	0	24
Selenio	mcg/Kg	240	210	240	280	280	300	300	230	300	300	300	300	340	0	0	0	8.500

ANALISI

FATTI CON
INGREDIENTI
NO OGM

Formule di mantenimento Formule Allevatori Multispecie

Parametro	Unità	High Energy	High Protein	Mini	Minor	Micro	Omega	Lory Gel	Lory Nectar	Lory Diet	Lory Pearls	Microspheres © 20/10	Eggfood	High Energy Breeding	High Protein Breeding	Parrot Maintenance	Parrot Breeder
Umidità	%	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	8,0	8,0	6,0	8,0	8,0	8,0	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Energia metabolica	Kcal/Kg	3.220	3.050	3.210	3.380	3.380	3.480	3.100	2.570	2.870	2.390	3.380	3.740	3.480	3.320	3.150	3.210
Proteina cruda	%	17,0	21,5	15,1	18,0	16,0	23,5	17,0	7,0	13,0	16,0	20,0	22,0	23,5	24,5	15,5	21,6
Metionina	%	0,4	0,5	0,3	0,5	0,5	0,7	0,5	0,2	0,5	0,8	0,6	0,6	0,7	0,7	0,3	0,5
Lisina	%	1,0	1,2	0,8	0,9	0,8	1,4	0,9	0,4	0,8	0,3	1,0	1,2	1,4	1,5	0,9	1,2
Grassi grezzi	%	11,0	8,0	7,5	10	7,5	15,0	8,0	3,0	5,0	7,0	10,0	15,0	15,0	12,0	7,0	11,0
Fibra grezza	%	4,4	5,1	4,3	4,0	3,2	5,1	4,3	4,8	3,7	11,5	4,0	3,5	5,1	5,2	4,5	4,9
Cenere	%	5,2	5,7	4,3	4,8	4,1	5,8	4,4	3,2	3,6	3,4	4,8	4,9	5,8	6,0	5,2	5,7
Calcio	%	0,7	0,8	0,5	0,5	0,4	0,8	0,6	0,3	0,6	0,6	0,5	0,6	0,8	0,8	0,7	0,7
Fosforo disp.	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
Vit. A retinolo	U.I./Kg	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	4.700	3.300	2.500	2.750	4.000	5.000	5.000	4.700	4.800	4.000	4.000
Vit. A attiva	U.I./Kg	20.000	20.000	20.000	30.000	25.000	60.000	40.000	50.000	30.000	20.000	25.000	55.000	60.000	25.000	20.000	25.000
Vit. D3	U.I./Kg	1.300	1.400	1.100	1.100	1.100	1.500	1.000	550	800	800	1.100	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Vit. E	mg/Kg	240	190	300	250	210	400	180	110	140	200	250	230	400	300	190	350
Vit. C	mg/Kg	140	100	100	200	200	200	75	35	50	55	200	200	200	200	100	150
Vit. K3	mg/Kg	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	4,2	2,5	3,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	5,0
Vit. B1	mg/Kg	20	20	20	20	25	25	20	14	20	40	25	25	25	25	20	25
Vit. B2	mg/Kg	16	16	16	16	20	20	16	10	13	30	20	20	20	20	16	20
Vit. B6	mg/Kg	20	20	20	20	25	25	20	14	17	35	25	25	25	25	20	25
Vit. B12	mcg/Kg	80	80	80	80	100	100	80	50	65	120	100	100	100	100	80	100
Acido pantotenico	mg/Kg	16	16	16	16	20	20	16	10	13	30	20	20	20	20	16	20
Acido nicotinico	mg/Kg	100	100	100	100	125	125	100	65	80	130	125	125	125	125	100	125
Acido folico	mg/Kg	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	4,0	2,5	3,2	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	5,0
Biotina	mcg/Kg	700	700	700	700	800	800	700	400	550	1.100	800	800	800	800	700	800
Colina	mg/Kg	1.400	1.400	1.400	1.400	1.800	1.700	1.100	900	1.000	1.500	1.800	1.800	1.700	1.700	1.400	1.500
B-carotene	mg/Kg	10	10	12	15	12	40	22	30	16	10	15	30	40	15	10	10
Manganese	mg/Kg	72	60	70	85	76	81	55	39	46	70	86	76	81	84	70	74
Iodio	mg/Kg	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0,7	0,5	0,6	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8
Zinco	mg/Kg	60	49	49	58	72	57	55	24	40	60	59	63	57	60	58	59
Ferro	mg/Kg	155	68	109	120	75	148	89	70	89	80	125	87	148	155	151	148
Rame	mg/Kg	8,0	6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	7,0	3,0	5,0	10,0	8,0	7,0	8,0	8,0	6,0	8,0
Selenio	mcg/Kg	270	270	270	300	300	300	230	170	190	250	300	300	300	300	270	280



Psittacus Catalonia, S.L.

C/ Àfrica, 1, Pol. Ind. Can Mora
08459 St. Antoni de Vilamajor (Spain)
T. +34 93 841 12 67
info@psittacus.com
www.psittacus.com

Seguici su  YouTube

PSITTACUSTV



DISTRIBUTORE PER L'ITALIA:


MennutiGroup
D I S T R I B U Z I O N E

Via Ponte Cerretano 10,
50050 Cerreto Guidi (FI)
Tel. +39 0571 1919001
info@mennutigroupdistribuzione.it

Edizione settembre 2022

PSITTACUS 